

ZFP-Literaturstudium

Im Rahmen des Zahnärztlichen Fortbildungsprogramms der Österreichischen Zahnärztekammer (ZFP-ÖZÄK) ist es möglich, durch das Literaturstudium Punkte für das ZFP zu erwerben.

Nach der Lektüre des ZFP-Artikels beantworten Sie bitte die Multiple-Choice-Fragen. Durch korrekte Beantwortung von mehr als 6 artikelspezifischen Fragen sind 3 Fortbildungspunkte zu erlangen. Diese 3 Fortbildungspunkte werden durch die korrekte Beantwortung von mindestens zwei Drittel der gestellten Fragen erreicht.

Die Auswertungen werden an die Österreichische Zahnärztekammer weitergeleitet, wo die Punkte auf Ihr Fortbildungskonto gebucht werden.

Schicken Sie diese Seite entweder per Post, Fax oder E-Mail an die Redaktion von Springer-Medizin Wien (z. Hd. Susanna Hinterberger), Prinz-Eugen-Straße 8-10, 1040 Wien
Fax: 01/3302426,
E-Mail: susanna.hinterberger@springer.at

Einsendeschluss: 14. Mai 2021

Internet: Sie haben die Möglichkeit, den Fragebogen unter **SpringerMedizin.at** herunterzuladen.

❓ **Mit welcher Häufigkeit treten Gebissanomalien bei Kindergarten- und Grundschulkindern auf?**

- 27 Prozent
- 37 Prozent
- 47 Prozent
- 57 Prozent
- 67 Prozent

❓ **Wie sollte der Beginn einer kieferorthopädischen Therapie idealerweise gewählt werden?**

- Behandlungsdauer sollte möglichst lang sein
- Behandlungsdauer sollte möglichst kurz sein
- Start ab Durchbruch des ersten Milchzahns
- Start ab Durchbruch des ersten bleibenden Zahns
- Start nach Abschluss der skeletalen Entwicklung

❓ **Ab welchem Zeitpunkt kann eine Frühbehandlung frühestens eingeleitet werden?**

- Zweites Lebensjahr
- Drittes Lebensjahr
- Viertes Lebensjahr
- Fünftes Lebensjahr
- Sechstes Lebensjahr

❓ **Bei welcher Anomalie ist eine frühe kieferorthopädische Behandlung eher nicht indiziert?**

- Aufgefächerte Oberkieferfront infolge einer Parodontitis
- Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte
- Ausgeprägter skeletal offener Biss
- Stark ausgeprägte Prognathie
- Pierre-Robin-Sequenz

❓ **Ab welchem Alter kann davon ausgegangen werden, dass die Entwicklung dentaler und fazialer Strukturen weitgehend abgeschlossen ist?**

- Acht bis zehn Jahre
- Zehn bis zwölf Jahre
- Zwölf bis 15 Jahre
- 15 bis 18 Jahre
- 18 bis 25 Jahre

❓ **Bei der Behandlung eines Neugeborenen mit Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte wird als erster Behandlungsschritt zeitnah postnatal eine Abformung für eine Trinkplatte angefertigt. Welche Funktion erfüllt eine Trinkplatte in diesem Fall am ehesten?**

- Ermöglichung einer suffizienten Nahrungsaufnahme
- Förderung der Einlagerung der Zunge in den Spaltbereich
- Aufhebung ästhetischer Einschränkungen
- Ermöglichung der Verwendung eines Schnullers
- Förderung der Selbstheilung des Gaumendefekts

❓ **Bis zu welchem Alter ist bei Abgewöhnen von Habits am ehesten noch mit einem Selbstausgleich von entstandenen Folgen zu rechnen?**

- Drittes Lebensjahr
- Fünftes Lebensjahr
- Siebtes Lebensjahr
- Zehntes Lebensjahr
- 15. Lebensjahr

❓ **Wann wird eine reguläre kieferorthopädische Therapie normalerweise eingeleitet?**

- Bei Vollständigkeit des Milchgebisses
- Bei Vollständigkeit des permanenten Gebisses
- Zu Beginn der späten Wechselgebissphase
- Zu Beginn der frühen Wechselgebissphase
- Nach Durchbruch der Sechsjahrmolaren

Bei der halbjährlichen Routinekontrolle stellen Sie bei einem 16-jährigen Patienten einige dentoalveoläre Abweichungen fest. Sonstige Dysgnathien liegen nicht vor. Der Patient wünscht eine Korrektur der vorliegenden Fehlstellungen. Sie empfehlen daher eine Vorstellung in einer kieferorthopädischen Fachpraxis. Behandelt wird der Patient dort am ehesten mit welcher kieferorthopädischen Apparatur?

- Herausnehmbare Platte
- Multibracket-Apparatur
- Retainer in Ober- und Unterkiefer
- Lückenhalter
- Funktionskieferorthopädische Apparatur

Was sollte sich im Idealfall an jede kieferorthopädische Behandlung unbedingt anschließen?

- Antiinfektiöse Therapie
- Externes Bleaching aller Zähne
- Diagnostik einer kranio-mandibulären Dysfunktion (CMD)
- Retentionsphase
- Digitale-Volumentomographie-Aufnahme von Ober- und Unterkiefer

BITTE AUSFÜLLEN

Absender (Bitte gut leserlich ausfüllen)

Frau

Herr

Name

Straße/Gasse

Ort/PLZ

Telefon

Zahnarzt ID _ _ _ _ _

Altersgruppe < 30

41 bis 50

31 bis 40

51 bis 60

> 60